

令和6年度 八千代市定期予防接種事業

※ 令和6年4月1日現在

予防接種名	接種期間	標準的な接種期間	接種回数・間隔		予診票発送時期	
ロタウイルス	●ロタリックス(1価) 生後6週0日～24週0日	初回接種は、生後2か月～出生14週6日まで	2回	27日以上の間隔をあけて2回経口投与	生後2か月前 ※1「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」を個別通知	
	●ロタテック(5価) 生後6週0日～32週0日	初回接種は、生後2か月～出生14週6日まで	3回	27日以上の間隔をあけて3回経口投与		
B型肝炎	1歳未満	生後2か月～9か月未満	3回	1回目から27日以上の間隔をおいて2回目、1回目から139日以上の間隔をおいて3回目を接種	生後2か月前 ※1「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」を個別通知	
ヒブ	生後2か月～5歳未満 *接種開始年齢で接種回数は異なります	初回接種開始年齢	生後2か月～7か月未満(標準的な接種年齢)	初回：3回 追加：1回	27日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種 *初回2回目、3回目は1歳未満に行う 初回接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔で1回接種	生後2か月前 ※1「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」を個別通知 *令和6年4月1日より5種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、不活化ポリオ、ヒブ)の定期接種が開始 令和6年1月生まれまで： ヒブと四種混合の予診票で送付 令和6年2月生まれから： 5種混合の予診票で送付
			生後7か月～1歳未満	初回：2回 追加：1回	27日以上、標準的には56日までの間隔で2回接種 *初回2回目は1歳未満に行う 初回接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔で1回接種	
			1歳～5歳未満	1回		
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満 *接種開始年齢で接種回数は異なります	初回接種開始年齢	生後2か月～7か月未満(標準的な接種年齢)	初回：3回 追加：1回	標準的には、生後1歳までに27日以上の間隔で3回接種 *初回2回目及び3回目の接種は、2歳未満に行う *初回2回目の接種が1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わない 初回接種終了後60日以上の間隔をあけて1歳以降に標準的には1歳～1歳3か月に1回接種	生後2か月前 ※1「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」を個別通知
			生後7か月～1歳未満	初回：2回 追加：1回	27日以上の間隔をあけて標準的には生後12か月までに2回接種 *初回2回目は2歳未満に行う 初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて1歳以降に1回接種	
			1歳～2歳未満	2回	60日以上の間隔をあけて2回接種	
			2歳～5歳未満	1回		
5種混合 (ジフテリア、破傷風、百日せき、不活化ポリオ、ヒブ) *令和6年4月1日より定期接種が開始	生後2か月～7歳6か月未満 *4種混合、3種混合ワクチン及び不活化ポリオワクチンを接種している方は接種不要です	生後2か月～7か月未満	初回：3回	20日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種	生後2か月前 ※1「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」を個別通知 令和6年1月生まれまで： ヒブと四種混合の予診票で送付 令和6年2月生まれから： 5種混合の予診票で送付	
		初回(3回)接種終了後から6か月～18か月未満	追加：1回	初回(3回)接種終了後6か月以上の間隔をあけて1回接種		
4種混合 (ジフテリア、破傷風、百日せき、不活化ポリオ)	生後2か月～7歳6か月未満 *5種混合、3種混合ワクチン及び不活化ポリオワクチンを接種している方は接種不要です *既に4種混合とヒブで接種を開始されている方は、原則同一ワクチンで接種を完了させます	生後2か月～1歳未満	初回：3回	20日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種	生後2か月前 ※1「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」を個別通知 令和6年1月生まれまで： ヒブと四種混合の予診票で送付 令和6年2月生まれから： 5種混合の予診票で送付	
		初回(3回)接種終了後から1年～1年6か月未満	追加：1回	初回(3回)接種終了後6か月以上の間隔をあけて1回接種		
3種混合 (ジフテリア、破傷風、百日せき)	生後2か月～7歳6か月未満 *5種混合、4種混合を接種している方は接種不要です	生後2か月～1歳未満	初回：3回	20日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種	市内委託医療機関でお受け取りください。 市外で接種を希望される場合、母子保健課へお問い合わせください。	
		初回(3回)接種終了後から1年～1年6か月未満	追加：1回	初回(3回)接種終了後6か月以上の間隔をあけて1回接種		
2種混合 (ジフテリア、破傷風)	11歳～13歳未満	11歳	1回		11歳となる誕生日の前月月末に個別通知	
不活化ポリオ	生後2か月～7歳6か月未満 *経口生ポリオワクチンを2回接種している方は接種不要です *5種混合、4種混合を接種する方は接種不要です	生後2か月～1歳未満	初回：3回	20日以上標準的には56日までの間隔で3回接種 *経口生ポリオワクチンを1回接種している方は2回	市内委託医療機関でお受け取りください。 市外で接種を希望される場合、母子保健課へお問い合わせください。	
		初回接種終了後から1年～1年6か月未満	追加：1回	初回(3回)接種終了後6か月以上の間隔をあけて1回接種		
BCG	1歳未満	生後5～8か月未満	1回		生後2か月前 ※1「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」を個別通知	
麻疹しん風しん混合	1期：1歳～2歳未満 2期：小学校就学前の1年間	1歳になったらできるだけ早いうちに	1回		生後2か月前 ※1「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」を個別通知	
			1回		令和6年3月末に個別通知	
水痘	生後1歳～3歳未満	1回目の接種は生後12か月～15か月未満	2回	3か月以上、標準的には6か月～12か月までの間隔をあけて2回接種 *すでに水痘に罹患したことがある方は対象なりません。	生後2か月前 ※1「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」を個別通知	
日本脳炎	1期：生後6か月～7歳6か月未満	3歳	初回：2回	6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をあけて2回接種	生後2か月前 ※1「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」を個別通知	
		4歳	追加：1回	初回(2回)接種終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をあけて1回接種		
		2期：9歳～13歳未満	1回			9歳となる誕生日の前月月末に個別通知
子宮頸がん予防	小学校6年生～高校1年生相当の女子 キャッチアップ接種 積極的勧奨の差し控えにより予防接種を受ける機会を逸した方 (平成9年4月2日～平成20年4月1日)	(接種期間) 20歳未満	2回又は3回	接種回数や間隔はワクチンの種類や接種開始年齢によって異なります。 医療機関又は母子保健課にご相談ください。 ※2 交互接種について 現在、2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)、9価(シルガード)が接種可能です。原則として同一ワクチンで接種を完了させますが、医師と相談の上、残りの接種に9価を選択することも可能です。	令和6年3月末に個別通知 (新小学校6年生)	
				(接種期間) 令和7年3月31日まで	3回	令和4年4月25日時点で八千代市に住民登録のある対象者に一斉送付しています。 ご転入の方は予診票を発行しますので、母子保健課へご連絡ください。

※1 「八千代市乳児期から受ける予防接種のお知らせ」の内容…ロタウイルス(3枚)、B型肝炎(3枚)、小児肺炎球菌(4枚)、5種混合(4枚)、BCG、日本脳炎第1期(3枚)、麻疹しん風しん混合1期(1枚)、水痘(2枚)

(令和6年1月生までは、4種混合とヒブで送付)
※2 令和5年4月1日より9価(シルガード)が定期接種として接種可能となりました。